Aktive Folsäure

Folimetin aktiv

BURG-APOTHEKE | LAB
Pharma-Know-how. Herstellungskompetenz. Produktinnovationen.

Inhaltsstoffe:

Calcium-L-Methyltetrahydrofolat 1 mg, Glycerin, Ascorbinsäure, Citronensäure, WFI

☐ Defektur	☒ Rezeptur
Darreichung:	5 x 1 ml Injektionslösung
Anwendung:	s.c.; i.m.; i.v.; zu verdünnen in 10–100 ml NaCl 0,9 %
Infusionsbesteck:	normal
Laufzeit:	10 Minuten als Shot vorab
Therapiezyklus:	1–2 x pro Woche Zeitraum: 6–10 Wochen
Haltbarkeit:	4 Monate*
Kühlware:	ja
Nebenwirkungen:	nicht bekannt

*Folimetin aktiv ist ein neues Produkt aus dem Labor der Burg-Apotheke. Nach vorliegenden Literaturrecherchen können wir aktuell eine Haltbarkeit von 4 Monaten garantieren. Wir werden die Substanz fortlaufend analysieren und gehen davon aus, dass die Haltbarkeitsangabe auf Basis der Untersuchungsergebnisse verlängert werden kann. Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, können sich vor Ablauf der jetzt angegebenen Haltbarkeit die neuen Stabilitätsdaten gern von unserem Team schriftlich mitteilen lassen.

Angezeigte Indikationen:

- Methylfolat ist die biologisch aktive Form der Folsäure.
- 80 % der Deutschen haben einen Folsäuremangel.
- Bei einer vorliegenden MTHFR-Mutation sollte ein Folsäure-Mangel über Ca-L-Methyltetrahydrofolat ausgeglichen werden. Aus diesem Grund haben wir synthetische Folsäure aus unserem Sortiment gestrichen. Synthetsiche Folsäure kann Folatrezeptoren blockieren und den Methylisierungszyklus behindern. Biologisch aktives Methylfolat fungiert als Cofaktor bei zahlreichen lebenswichtigen Funktionen, etwa bei der Zellneubildung, Zellteilung, Blutzellbildung, Homocystein-Regulation und beim Aufbau von DNA.
- Begleitend bei der Therapie von Antriebslosigkeit und Depression, Immunschwäche, Polyneuropathie, Mitochondriopathie u. a.

Hinweis für Ärzte und Therapeuten:

Grundsätzlich legt bei Individualrezepturen der Arzt/Therapeut die Indikation fest. Unsere Angaben zur Therapie sollen somit eine Empfehlung für eine Therapieoption sein, wobei die Dosierung und Häufigkeit der Anwendung allein in der Entscheidung des Arztes/Therapeuten liegt.

Der behandelnde Therapeut ist für die Behandlung verantwortlich und muss die jeweilige Applikation vor Behandlungsbeginn individuell für jeden Patienten prüfen und beurteilen.

Hinweis: Achten Sie auf Hautreizungen wie Rötungen oder Überwärmungen im Bereich der Einstichstelle der Infusionsnadel, die auf Entzündungen hindeuten können. Bewusstseinsstörungen, Schwellungen oder Atemnot sind typische Symptome von Komplikationen, die bei einer Infusion auftreten können.

Bestellnummer	Bezeichnung	Darreichung	Preis (brutto)	Stück
PZN 8118126	**Folimetin aktiv**	**5 x 1 ml Inf.-Konz. s.c., i.m., i.v.**	**34,90 €**	

Liefer- & Rechnungsadresse:

Name

Straße

PLZ und Ort

Datum/Unterschrift

Stempel

Burg-Apotheke Königstein · Apotheker Uwe-Bernd Rose e. K. · Frankfurter Straße 7 · 61462 Königstein im Taunus/Germany
Telefon: +49 6174 9929-500 · Telefax: +49 6174 9929-692 · therapiebestellung@apotheke-koenigstein.de · www.rezeptur.de

Credit: Shutterstock © Antonio Guillem